

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẠ CAM MỀM

I- ĐẠI CƯƠNG :

Bệnh hạ cam mềm (Chanere mou) là bệnh lây truyền qua đường sinh dục cấp tính với biểu hiện lâm sàng là loét đau tại vị trí nhiễm trùng thường khu trú ở bộ phận sinh dục ngoài ra diễn tiến đến hạch vùng mông mủ.

Bệnh do Haemophilus Ducreyi gây ra. Là vi khuẩn gram âm, yếm khí, ưa máu.

II- LÂM SÀNG :

Thời kỳ ủ bệnh 3-5 ngày . sau đó ở bộ phận sinh dục xuất hiện một mụn mủ và vỡ ra thành vết loét gọi là :

a - Săng hạ cam mềm :

- Là một vết loét sâu , bờ rõ quanh co , đường kính từ 3 -5 mm
- Thường có mủ trên bề mặt
- Đáy vết loét không bằng phẳng mà có những chồi thịt nhỏ
- Đặc biệt là bờ đôi peteges (ngoài đỏ trong vàng)
- Săng hạ cam mềm nằm trên vùng da sưng phù bốp mền và đau .
- Vị trí : Thường ở bộ phận sinh dục ngoài
 - + Nam : Thường có bao trong da qui đầu nếp hãm qui đầu.....
 - + Nữ : môi lớn , nhỏ ...
- Số lượng : Một hoặc nhiều săng .

b . Hạch

Là biến chứng chứ không phải triệu chứng chỉ 1/3 trường hợp có hạch .

* CẬN LÂM SÀNG :

- 1 . Nhuộm gram soi thấy trực khuẩn Ducreyi (lấy bệnh phẩm ở bờ vết loét)
- 2 . Cây trùng

III- CHẨN ĐOÁN :

1- Chẩn đoán xác định : dựa vào

- Triệu chứng lâm sàng: Săng hạ cam mềm, hạch viêm(trong 1/3 trường hợp).
- Tìm trực khuẩn H. Ducreyi bằng cách lau sạch mủ,lấy bệnh phẩm ở bờ loét, nhuộm gram,thấy trực khuẩn H.Ducreyi hình thoi ăn màu gram(-) ở giữa nhạt màu, còn hai đầu sậm màu. Trong một nửa trường hợp xét nghiệm có thể âm tính

2-Chẩn đoán phân biệt :

- Săng giang mai.
- Herpes sinh dục.
- Săng Hột Xoài.
- Săng Ghẻ.

VI- ĐIỀU TRỊ .

* Nguyên tắc :

- 1 . Điều trị cho bệnh nhân và người đồng sàng.
- 2 . Phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Tránh làm việc nặng để hạn chế biến chứng.
- 3 . Điều trị song song toàn thân và tại chỗ.

* Điều trị tại chỗ :

- Dung dịch màu : Milian, Eosin 2% , Thoa
- Rửa bằng thuốc tím pha loãng 1/10.000.

* Điều trị toàn thân :

TÊN THUỐC	LIỀU LƯỢNG	Thời gian
Ceftriaxone	250mg TIÊM BẮP	Liều duy nhất
Azithromycin	1g , uống	Liều duy nhất
Ciprofloxacin	500mg x 2 lần/ ngày , uống	3 ngày
Erythromycin	500mg x 4 lần/ ngày, uống	7 ngày

Tài liệu tham khảo :

- 1) Phác đồ điều trị bệnh Da liễu- TPHCM- Năm 2014
- 2) PGS.TS –Phạm Thế Hiền – Chủ biên Da liễu học- Năm 2012
- 3) BS. Vũ Hồng Thái – Chủ biên Bệnh Học Da liễu- BV Da liễu TPHCM-Năm 2012

