



# BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU ĐỐC

## ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC

### ĐIỂM TIN THÔNG TIN THUỐC – SỐ 06/2026

Trang

#### Điểm tin số 1

CBIP: Hạ natri máu nghiêm trọng khi sử dụng các thuốc chống trầm cảm SSRI và SNRI

01

#### Điểm tin số 2

Nhắc lại về một số phản ứng có hại nghiêm trọng khi sử dụng amiodaron

02

Trưởng ban: BS. CKII Võ Minh Hiền

Thư ký: DS. Huỳnh Như


Điểm tin: DS. Nguyễn Ngọc Trinh

**Điểm tin số 1:** CBIP: Hạ natri máu nghiêm trọng khi sử dụng các thuốc chống trầm cảm SSRI và SNRI




Nguy cơ hạ natri máu nghiêm trọng khi sử dụng các loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm SSRI và SNRI, tiêu biểu là **venlafaxin**

**Định nghĩa và triệu chứng**



**Hạ natri máu nghiêm trọng** được xác định khi nồng độ natri máu dưới 125 mmol/l. Các triệu chứng chính bao gồm *buồn nôn, nôn, mệt mỏi, rối loạn ý thức, mất thăng bằng và có thể gây co giật do phù tế bào não*

**Đối tượng nguy cơ cao nhất:**




Nguy cơ này đặc biệt lớn đối với người cao tuổi. Cụ thể, tỉ lệ hạ natri máu là 3% ở người từ 65-79 tuổi và tăng lên 4% ở người trên 80 tuổi. Phụ nữ trên 80 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất với tần suất xuất hiện biến cố lên đến 6,5%

**Các yếu tố nguy cơ kết hợp**

Nguy cơ sẽ tăng lên nếu bệnh nhân có các yếu tố đi kèm như **suy thận, suy tim, xơ gan, suy tuyến thượng thận** hoặc đang *sử dụng đồng thời* các thuốc gây hạ natri máu khác như **thuốc lợi tiểu**


**Khuyến cáo**




- Nhân viên y tế cần cảnh giác và theo dõi cẩn thận bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ từ 65 tuổi trở lên, trong những tháng đầu điều trị.
- Các đối tượng cần đặc biệt lưu tâm bao gồm người cao tuổi và phụ nữ trên 80 tuổi, với những triệu chứng nguy hiểm như co giật hay rối loạn ý thức.

TLTK: <https://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/5831/cbip-ha-natri-mau-khi-su-dung-cac-ssri-snri.htm>

**Điểm tin số 2:**  
MHRA: Nhắc lại  
về một số phản  
ứng có hại  
nghiêm trọng khi  
sử dụng  
amiodaron




### Chỉ định và đặc tính



Amiodaron được dùng cho các trường hợp rối loạn nhịp tim (như rung nhĩ, nhịp tim nhanh) khi các liệu pháp khác không phù hợp hoặc thất bại.

Thuốc **có thời gian bán thải rất dài (khoảng 50 ngày)**, dẫn đến khả năng tích lũy trong cơ thể và khiến các phản ứng có hại có thể kéo dài nhiều tuần hoặc tháng sau khi ngừng thuốc.

### Các phản ứng có hại nghiêm trọng




Thuốc có thể gây độc tính trên nhiều cơ quan như phổi, tuyến giáp, gan, mắt, tim, da và thần kinh.

- **Độc tính trên phổi:** Có thể gây viêm phổi mô kẽ dẫn đến xơ hóa phổi đe dọa tính mạng. Triệu chứng bao gồm khó thở nghiêm trọng, ho khan, mệt mỏi, sụt cân.
- **Rối loạn tuyến giáp:** Có thể gây suy giáp hoặc cường giáp.
- **Độc tính trên gan:** Biểu hiện qua vàng da, vàng mắt, đau bụng, mệt mỏi hoặc sốt cao

TLTK:

<https://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/5830/mhra-nhac-lai-phan-ung-co-hai-nghiem-trong-do-amiodaron.htm>

### Khuyến cáo



- Xét nghiệm định kỳ: kiểm tra chức năng gan và tuyến giáp trước khi điều trị, định kỳ 6 tháng một lần trong khi dùng thuốc và vài tháng sau khi ngừng thuốc.
- Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến amiodaron.

Tiểu ban Giám sát Thông tin thuốc



PHÓ GIÁM SỐC

BS. CKII. Võ Minh Hiền

Đơn vị Thông tin thuốc - Số 06/2026